

УДК 510.25

# О сравнении интегралов Дарбу и Римана в конструктивном математическом анализе

А. А. Владимиров

АННОТАЦИЯ. В статье устанавливается, что эквивалентные с точки зрения „классической“ математики определения интеграла функции одного вещественного аргумента по Дарбу и по Риману в рамках конструктивного математического анализа А. А. Маркова оказываются существенно различными.

## § 1. Введение

1. В рамках „классической“ теоретико-множественной математики известно два основных способа определения одномерного интеграла Римана: в качестве предела интегральных сумм при исчезновении измельчённости дробления (подход Римана), и в качестве промежуточного значения множеств интегралов «элементарно интегрируемых» функций, оценивающих рассматриваемую (подход Дарбу). С точки зрения „классической“ математики указанные два подхода приводят к равнообъёмным понятиям. Основная цель настоящей статьи заключается в построении примера всюду на отрезке  $[0, 1]$  заданной функции, интегрируемой по Риману, но не интегрируемой по Дарбу, с точки зрения конструктивного математического анализа.

В дальнейшем мы всегда, не оговаривая этого особо, будем исходить из конструктивного понимания математических суждений, как оно даётся ступенчатой семантической системой А. А. Маркова [1], [2].

2. Конструктивный вариант определения Римана рассматривался неоднократно и в настоящее время может считаться стандартным [3, Гл. 7, § 1]. Конструктивную интегрируемость по Дарбу мы вводим следующим образом:

**2.1.** *Функция  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  называется интегрируемой по Дарбу, если для любого вещественного числа  $\varepsilon > 0$  осуществимы две полигональные функции  $f_\varepsilon^\downarrow$  и  $f_\varepsilon^\uparrow$ , удовлетворяющие соотношениям*

$$(\forall x \in [0, 1]) \quad f_\varepsilon^\downarrow(x) \leq f(x) \leq f_\varepsilon^\uparrow(x),$$

$$\int_0^1 (f_\varepsilon^\uparrow - f_\varepsilon^\downarrow) < \varepsilon.$$

Здесь и далее функцию  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  мы называем *полигональной* (ср. [3, Гл. 5, § 1, Определение 7], [4, § 1]), если осуществимы список  $\{q_k\}_{k=0}^m$  рациональных чисел и упорядоченный по возрастанию список  $\{p_k\}_{k=0}^m$  попарно различных рациональных точек отрезка  $[0, 1]$ , удовлетворяющие соотношениям  $p_0 = 0$ ,  $p_m = 1$  и

$$(\forall k \in \mathbb{N} : 1 \leq k \leq m) (\forall x \in [p_{k-1}, p_k]) \quad f(x) = \frac{q_k \cdot (x - p_{k-1}) + q_{k-1} \cdot (p_k - x)}{p_k - p_{k-1}}.$$

Под *полигональным интегралом* такой функции, как обычно [3, Гл. 8, § 2, Определение 6], [4, § 1], понимается величина

$$\int_0^1 f \Rightarrow \sum_{k=1}^m \frac{(q_k + q_{k-1}) \cdot (p_k - p_{k-1})}{2},$$

численно совпадающая с интегралом Римана.

## § 2. Вспомогательные утверждения

1. Очевидным образом имеет место следующий факт:

**1.1.** Пусть функция  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  интегрируема по Дарбу. Тогда для любого рационального числа  $\varepsilon > 0$  осуществимы рациональное число  $\delta > 0$  и неотрицательная полигональная функция  $g$ , удовлетворяющие соотношениям

$$\int_0^1 g < 1/2,$$

$$(\forall x, y \in [0, 1] : \sup(g(x), g(y)) < 1, |x - y| < \delta) \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

2. Следующее утверждение представляет собой удобный для наших дальнейших целей аналог известной [3, Гл. 8, § 1, Теорема 2], [4, Теорема 2.1] теоремы о сингулярных покрытиях. Оно может также быть рассмотрено в качестве варианта конструктивного опровержения [5, Замечание 2] теоремы Лебега о мажорируемой сходимости.

**2.1.** Осуществима неубывающая последовательность  $\{h_n\}_{n=0}^\infty$  неотрицательных полигональных функций, удовлетворяющая соотношениям

$$(1) \quad (\forall x \in [0, 1]) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = 2,$$

$$(2) \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \quad \int_0^1 h_n < 1/2.$$

**Доказательство.** Зафиксируем [3, Гл. 8, § 1, Теорема 2] накрывающую отрезок  $[0, 1]$  последовательность  $\{(a_n, b_n)\}_{n=0}^\infty$  непустых интервалов с рациональными концами, удовлетворяющую соотношению

$$(3) \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \quad \sum_{k=0}^n (b_k - a_k) < 1/6.$$

Введём в рассмотрение последовательность  $\{\varphi_n\}_{n=0}^\infty$  полигональных функций вида

$$(4) \quad (\forall n \in \mathbb{N}) (\forall x \in [0, 1]) \quad \varphi_n(x) = \inf \left( 1, \sup \left( 0, 2 - \frac{|2x - b_n - a_n|}{b_n - a_n} \right) \right),$$

а также неубывающую последовательность  $\{h_n\}_{n=0}^\infty$  неотрицательных полигональных функций, рекуррентно заданную соотношениями

$$(5) \quad (\forall x \in [0, 1]) \quad h_0(x) = 0,$$

$$(6) \quad (\forall n \in \mathbb{N}) (\forall x \in [0, 1]) \quad h_{n+1}(x) = \sup(h_n(x), 2\varphi_n(x)).$$

Тогда при любом выборе индекса  $n \in \mathbb{N}$  выполняются неравенства

$$\int_0^1 h_{n+1} \leq \sum_{k=0}^n \int_0^1 2\varphi_k \quad [(5), (6)]$$

$$\leq \sum_{k=0}^n 3 \cdot (b_k - a_k) \quad [(4)]$$

$$< 1/2. \quad [(3)]$$

Кроме того, выполняется соотношение

$$(\forall n \in \mathbb{N}) (\forall x \in [0, 1]) \quad h_n(x) \leq 2, \quad [(5), (6), (4)]$$

а также обусловленное вложением  $[0, 1] \subseteq \bigcup_{n=0}^{\infty} (a_n, b_n)$  соотношение

$$(\forall x \in [0, 1]) (\exists n \in \mathbb{N}) \quad h_{n+1}(x) \geq 2. \quad [(6), (4)]$$

Тем самым, функциональная последовательность  $\{h_n\}_{n=0}^{\infty}$  удовлетворяет всем предъявленным в формулировке доказываемого утверждения требованиям.  $\square$

**3.** Произвольно фиксированным полигональной функции  $f$  и вещественному числу  $\varepsilon > 0$  можно сопоставить [6, § 11.2.2] функцию  $\omega(f, \varepsilon) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  вида

$$(\forall x \in [0, 1]) \quad [\omega(f, \varepsilon)](x) = \sup_{t, s \in [x-\varepsilon, x+\varepsilon] \cap [0, 1]} |f(t) - f(s)|.$$

Очевидным образом имеют место следующие два факта:

**3.1.** Пусть даны полигональная функция  $f$  и вещественное число  $\varepsilon > 0$ . Тогда функция  $\omega(f, \varepsilon) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  является равномерно непрерывной.

**3.2.** Пусть даны полигональная функция, вещественное число  $\varepsilon > 0$ , а также имеющее не превосходящую  $\varepsilon$  измелъчённость интегральное дробление  $\tau$  отрезка  $[0, 1]$ . Тогда отвечающее дроблению  $\tau$  значение  $I(f, \tau)$  интегральной суммы функции  $f$  удовлетворяет соотношению

$$\left| I(f, \tau) - \int_0^1 f \right| \leq \int_0^1 \omega(f, \varepsilon).$$

Также имеют место следующие два факта:

**3.3.** Пусть  $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$  — последовательность полигональных функций, поточечно сходящаяся к некоторой функции  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ . Пусть также для любого вещественного числа  $\varepsilon > 0$  осуществимо вещественное число  $\delta > 0$ , удовлетворяющее соотношению

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad \int_0^1 \omega(f_n, \delta) < \varepsilon.$$

Тогда функция  $f$  интегрируема по Риману.

**Доказательство.** Зафиксируем произвольное вещественное число  $\varepsilon > 0$ , а также вещественное число  $\delta > 0$ , удовлетворяющее соотношению

$$(1) \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \quad \int_0^1 \omega(f_n, \delta) < \varepsilon/3.$$

Тогда для любых двух интегральных дроблений  $\tau$  и  $\sigma$  отрезка  $[0, 1]$ , имеющих не превосходящую  $\delta$  измельчённость, будут выполняться соотношения

$$\begin{aligned} |I(f, \tau) - I(f, \sigma)| &= \lim_{n \rightarrow \infty} |I(f_n, \tau) - I(f_n, \sigma)| \\ &\leq 2\varepsilon/3 \\ &< \varepsilon. \end{aligned} \quad [3.2, (1)]$$

Интегрируемость функции  $f$  по Риману вытекает теперь из произвольности выбора вещественного числа  $\varepsilon > 0$  и критерия Коши.  $\square$

**3.4.** Пусть  $\alpha > 0$ ,  $\beta > 0$  и  $\zeta \in (0, 1)$  — рациональные числа, и пусть полигональная функция  $f$  имеет вид

$$(\forall x \in [0, 1]) \quad f(x) = \alpha \cdot \sup \left( 0, 1 - \frac{|x - \zeta|}{\beta} \right).$$

Тогда при любом выборе рационального числа  $\varepsilon > 0$  выполняется соотношение

$$(2) \quad \int_0^1 \omega(f, \varepsilon) \leq 8\alpha\varepsilon.$$

**Доказательство.** Заметим, что всегда выполняется одно из неравенств  $\varepsilon < \beta$  или  $\varepsilon \geq \beta$ .

В первом случае функция  $f$  является липшицевой с коэффициентом  $\alpha/\beta$ , а потому функция  $\omega(f, \varepsilon)$  мажорируется постоянной  $2\alpha\varepsilon/\beta$ . Кроме того, указанная функция обращается в нуль вне отрезка  $[\zeta - 2\beta, \zeta + 2\beta]$ . Тем самым, неравенство (2) выполняется.

Во втором случае функция  $\omega(f, \varepsilon)$  мажорируется постоянной  $\alpha$  и обращается в нуль вне отрезка  $[\zeta - 2\varepsilon, \zeta + 2\varepsilon]$ . Тем самым, неравенство (2) также выполняется.  $\square$

### § 3. Построение примера

**1.** На протяжении настоящего параграфа мы будем считать, что натуральные и рациональные числа представляют собой слова в трёхбуквенном алфавите  $\{ |, -, / \}$  [7, § 1.6], а списки рациональных чисел являются  $*$ -системами [7, § 24]. Поскольку любое конструктивное отображение множества натуральных чисел в множество  $*$ -систем рациональных чисел может быть задано посредством нормального алгорифма в шестибуквенном алфавите  $\{ |, -, /, *, a, b \}$  [7, § 41.7.1], то в дальнейшем мы будем ограничиваться рассмотрением именно таких алгорифмов.

**2.** Зафиксируем некоторую нумерацию  $\{\mathfrak{A}_n\}_{n=0}^{\infty}$  нормальных алгорифмов указанного в предыдущем пункте вида. Рассмотрим связанное с этой нумерацией множество индексов  $N$ , для которых процесс применения алгорифма  $\mathfrak{A}_N$  к слову  $N$  останавливается с

результатом вида

$$(1) \quad * \delta * p_0 * q_0 * \dots * p_m * q_m *,$$

где  $\delta$  — положительное рациональное число, а списки рациональных чисел  $\{p_k\}_{k=0}^m$  и  $\{q_k\}_{k=0}^m$  определяют [§ 1.2] некоторую неотрицательную полигональную функцию  $g$  со свойством

$$(2) \quad \int_0^1 g < 1/2.$$

Указанное множество индексов с очевидностью является бесконечным и полуразрешимым, а потому допускает перечисление без повторений некоторым полным арифметическим алгоритмом  $\mu : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ .

Последовательность рациональных чисел  $\delta$  из представления (1) результатов применения алгоритмов  $\mathfrak{A}_{\mu(n)}$  к словам  $\mu(n)$  мы на протяжении настоящего параграфа будем обозначать в виде  $\{\delta_n\}_{n=0}^\infty$ . Последовательность соответствующих полигональных функций мы будем обозначать в виде  $\{g_n\}_{n=0}^\infty$ . Кроме того, мы будем предполагать зафиксированной неубывающую последовательность  $\{h_n\}_{n=0}^\infty$  неотрицательных полигональных функций из утверждения § 2.2.1.

**3.** Имеют место следующие три факта:

**3.1.** *Осуществимы возрастающая последовательность  $\nu : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , а также последовательность  $\{\zeta_n\}_{n=0}^\infty$  рациональных точек интервала  $(0, 1)$  и последовательность  $\{\beta_n\}_{n=0}^\infty$  положительных рациональных чисел, удовлетворяющие соотношениям*

$$(1) \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \quad \beta_n < \inf(\delta_n, \zeta_n, 1 - \zeta_n),$$

$$(2) \quad (\forall n \in \mathbb{N}) (\forall x \in [\zeta_n - \beta_n, \zeta_n + \beta_n]) \quad [g_n + h_{\nu(n)}](x) < 1 < h_{\nu(n+1)}(x).$$

**Доказательство.** Положим  $\nu(0) \equiv 0$ . Построение значений  $\zeta_n$ ,  $\beta_n$  и  $\nu(n+1)$  на основе известного значения  $\nu(n)$  может теперь быть произведено следующим образом. В качестве  $\zeta_n$  выберем произвольную рациональную точку интервала  $(0, 1)$ , удовлетворяющую неравенству  $[g_n + h_{\nu(n)}](\zeta_n) < 1$ . Осуществимость такой точки гарантирована соотношениями

$$\begin{aligned} \int_0^1 (g_n + h_{\nu(n)}) &< 1/2 + 1/2 & [2(2), \S 2.2(2)] \\ &= 1. \end{aligned}$$

В качестве  $\nu(n+1)$  выберем произвольное натуральное число, удовлетворяющее неравенству  $h_{\nu(n+1)}(\zeta_n) > 1$ . Осуществимость такого числа гарантирована соотношением § 2.2(1). В качестве  $\beta_n$  теперь остаётся выбрать произвольное положительное рациональное число, чья малость будет достаточна для выполнения соотношений (1) и (2).  $\square$

**3.2.** Пусть  $\{f_n\}_{n=0}^\infty$  — последовательность полигональных функций вида

$$(3) \quad (\forall n \in \mathbb{N}) (\forall x \in [0, 1]) \quad f_n(x) = 2^{-\mu(n)} \cdot \sup \left( 0, 1 - \frac{|x - \zeta_n|}{\beta_n} \right),$$

где  $\{\zeta_n\}_{n=0}^\infty$  и  $\{\beta_n\}_{n=0}^\infty$  — числовые последовательности из утверждения 3.1. Тогда осуществима и интегрируема по Риману функция  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , удовлетворяющая соотношению

$$(\forall x \in [0, 1]) \quad f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x).$$

**Доказательство.** Зафиксируем произвольную точку  $x \in [0, 1]$ , а также номер  $n \in \mathbb{N}$ , удовлетворяющий неравенству  $h_{\nu(n)}(x) > 1$  [§ 2.2 (1)]. Тогда выполняется соотношение

$$(\forall k \in \mathbb{N} : k \geq n) \quad f_k(x) = 0, \quad [(3), (2)]$$

означающее сходимость ряда

$$\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x).$$

Кроме того, для любых вещественного числа  $\varepsilon > 0$  и номера  $n \in \mathbb{N}$  выполняются оценки

$$\begin{aligned} \int_0^1 \omega \left( \sum_{k=0}^n f_k, \varepsilon/16 \right) &\leq \sum_{k=0}^n \int_0^1 \omega(f_k, \varepsilon/16) \\ &< \sum_{k=0}^n 2^{-\mu(k)-1} \cdot \varepsilon \\ &< \varepsilon, \end{aligned} \quad [(3), \text{ § 2.3.4}]$$

означающие интегрируемость функции  $f$  по Риману [§ 2.3.3]. □

**3.3. Функция  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  из утверждения 3.2 не является интегрируемой по Дарбу.**

**Доказательство.** В случае интегрируемости рассматриваемой функции по Дарбу должен найтись [§ 2.1.1] алгоритм, перерабатывающий каждое натуральное число  $n$  в список вида  $2(1)$ , отвечающие которому положительное рациональное число  $\delta > 0$  и неотрицательная полигональная функция  $g$  удовлетворяют соотношению

$$(\forall x, y \in [0, 1] : \sup(g(x), g(y)) < 1, |x - y| < \delta) \quad |f(x) - f(y)| < 2^{-n-1}.$$

При этом, очевидно, найдётся также натуральное число  $m$ , для которого значение  $\mu(m)$  будет являться номером рассматриваемого алгоритма при нумерации из пункта 2. Однако тогда должны выполняться соотношения

$$g_m(\zeta_m + \beta_m) < 1, \quad [(2)]$$

$$g_m(\zeta_m) < 1, \quad [(2)]$$

$$\begin{aligned} |(\zeta_m + \beta_m) - \zeta_m| &= \beta_m \\ &< \delta_m, \end{aligned} \quad [(1)]$$

$$|f(\zeta_m + \beta_m) - f(\zeta_m)| = |f_m(\zeta_m + \beta_m) - f_m(\zeta_m)| \quad [(3), (2)]$$

$$= |0 - 2^{-\mu(m)}| \quad [(3)]$$

$$= 2^{-\mu(m)},$$

противоречащие сделанным предположениям о свойствах алгоритма  $\mathfrak{A}_{\mu(m)}$ . □

4. Заметим, что применительно к многомерному случаю утверждение об осуществимости функций, интегрируемых по Риману, но не интегрируемых по Дарбу, может быть получено в качестве следствия из результатов [8] о неверности теоремы Фубини для конструктивного интеграла Римана. Однако такое доказательство требует привлечения ряда дополнительных представлений, поэтому на его деталях мы здесь не останавливаемся.

### Список литературы

- [1] А. А. Марков. О языке  $\lambda$ -// ДАН СССР. — 1974. — Т. 215, № 1. — С. 57–60.
- [2] А. А. Владимиров, М. Н. Домбровский–Кабанченко. Ступенчатая семантическая система. — М.: Изд-во ВЦ РАН, 2009.
- [3] Б. А. Кушнер. Лекции по конструктивному математическому анализу. — М.: Наука, 1973.
- [4] И. Д. Заславский, Г. С. Цейтин. О сингулярных покрытиях и связанных с ними свойствах конструктивных функций// Труды Матем. ин-та им. В. А. Стеклова. — 1962. — Т. 67. — С. 458–502.
- [5] О. Демут. О конструктивном аналоге связи измеримости множеств и функций по Лебегу// Comment. Math. Univ. Carolinae. — 1973. — В. 14, № 3. — S. 377–396.
- [6] Н. А. Шанин. Конструктивные вещественные числа и конструктивные функциональные пространства// Труды Матем. ин-та им. В. А. Стеклова. — 1962. — Т. 67. — С. 15–294.
- [7] А. А. Марков, Н. М. Нагорный. Теория алгорифмов. Изд. 2. — М.: ФАЗИС, 1996.
- [8] О. Демут. О теореме Фубини для интеграла Римана в конструктивной математике// Comment. Math. Univ. Carolinae. — 1968. — В. 9, № 4. — S. 677–686.